



COVID-19: atendimento ambulatorial e em área de diagnóstico por imagem

Patrícia Mitsue Saruhashi Shimabukuro

Enfermeira SCIH

Hospital Sancta Maggiore



Sem conflito de interesses

Desafios

- Como retomar as atividades presenciais?
- Quais os recursos disponíveis?
- Temos estrutura física para esta retomada?
- Temos equipamentos de proteção individual?
- Quais as medidas de prevenção?



Fonte: Google imagens

Exposição dos profissionais

- Escassez de EPI;
- Infecção cruzada;
- Vestiários;
- Estrutura – climatização;

Acta Paul Enferm 2020; 33: eAPE20200107

REVISÃO SISTEMÁTICA

Infecção e óbitos de profissionais da saúde por COVID-19: revisão sistemática

Geisa Sant'Ana , Aline Mizusaki Imoto , Fábio Ferreira Amorim , Monica Taminato , Maria Stella Peccin , Levy Aniceto Santana , Leila Bernarda Donato Göttems , Erika Barbosa Camargo 

DOI: 10.37689/acta-ape/2020AO0107



Para a retomada do atendimento



NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020
ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) – atualizada em 25/02/2021

Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde
Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Publicada em 30 de janeiro de 2020

Atualização 1: 17 de fevereiro de 2020

Atualização 2: 21 de março de 2020

Atualização 3: 31 de março de 2020

Atualização 4: 08 de maio de 2020

Atualização 5: 27 de outubro de 2020

Atualização 6: 25 de fevereiro de 2021

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 – 25/02/2021
ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)

Consultas



Presencial: Gradual



Telemedicina: virtual

Capacitação dos profissionais



- Promoção do acolhimento;
- Uso de equipamento de proteção individual;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Fluxo do atendimento presencial;
- Abordagem de possíveis pacientes ou acompanhantes com sintomas gripais.

Nota Técnica CVE/CVS nº 01/2020

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO A SEREM ADOTADAS NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE RELACIONADAS À COVID-19

ELABORAÇÃO:

DIVISÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR/CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DIH/CVE
GRUPO TÉCNICO MÉDICO HOSPITALAR/DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE/ CENTRO DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GTMH/SERSA/ CVS

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS/SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO
PAULO

20 de junho de 2020

Nota Técnica • 04/DVE/2020

Biossegurança no atendimento de pacientes com suspeita de infecção por novo Coronavírus (SARS-CoV2) nos estabelecimentos assistenciais de saúde

Publicado em 28/01/2020
Versão 02: 12/02/2020
Versão 03: 18/02/2020
Versão 04: 09/03/2020
Versão 05: 13/04/2020

Última atualização: 06/07/2020

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COUISA



2020



Medidas de prevenção

- Uso obrigatório da máscara;
- Aferição de temperatura (colaboradores, pacientes e acompanhantes);
- Fluxo de acolhimento dos pacientes, acompanhantes e colaboradores com sintomas gripais;
- Disponibilização de álcool gel;
- Reforço da limpeza ambiental.

Centro de Vigilância Epidemiológica. Nota técnica nº 1/20. Medidas de prevenção e controle de infecção a serem adotadas na assistência à saúde relacionadas à COVID-19. junho/2020.



Medidas de prevenção

Uso obrigatório de máscara




Aferição de temperatura



Até 37,5°C

Fluxo de acolhimento em caso de sintomas gripais



Limpeza dos equipamentos



Raio-X



Densitometria
óssea



Mamografia



Raio-X portátil



Audiometria



Ultrassonografia

Fonte: Google imagens

Limpeza de equipamentos



Urodinâmica



Urofluxometria



Espirometria



Polissonografia



Eletrocardiograma



Holter

Fonte: Google imagens

Limpeza de equipamentos



MAPA



Colposcopia



Ecocardiograma



Teste ergométrico



Oftalmologia



Cintilografia

Fonte: Google imagens

Limpeza de equipamentos



Cintilografia



Endoscopia, Colonoscopia, Broncoscopia



Biópsia de próstata

Fonte: Google imagens



O que utilizar para limpar?

Environmental cleaning to prevent COVID-19 infection. A rapid systematic review

Patrícia Mitsue Saruhashi Shimabukuro^I, Márcio Luís Duarte^{II}, Aline Mizusaki Imoto^{III},
Álvaro Nagib Atallah^{IV}, Eduardo Signorini Bicas Franco^V, Maria Stella Peccin^{VI}, Mônica Taminato^{VII}

Department of Evidence-Based Health, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo (SP), Brazil

São Paulo Med. J. vol.138 no.6 São Paulo Nov./Dec. 2020 Epub Nov 13, 2020

- Produtos: base de cloro, álcool, glutaraldeído, detergentes a base de iodo e peróxido de hidrogênio são os mais indicados;
- Validar com a equipe do Serviço de Controle de Infecção;
- Diluição;
- Validade após a diluição;
- Utilização;
- Técnica para limpeza;
- Treinamento da equipe sobre o uso do produto.

Imunização dos profissionais



COVID-19



Influenza

Fonte: Ministério da Saúde

Equipamento de proteção



Avental gramatura



Luvas de procedimento



Máscara N95



Máscara cirúrgica



Touca



Face shield




Óculos de proteção

Sequência **colocação** dos EPIs


(1) Sequência de colocação dos EPI

- I. Reunir todo o equipamento de proteção individual necessário
- II. Higienizar as mãos

1. Capote ou avental



2. (a) Máscara cirúrgica ou (b) Máscara PFF-2, N-95 ou similar




- Adapte a haste flexível ao nariz (ponta do nariz);
- Adapte a máscara à face e abaixo do queixo;
- Confira a adaptação do respirador/máscara.

3. Gorro (procedimentos de maior risco)

4. (a) Protetor ocular (a) ou (b) protetor de face



5. Luvas **Calçar duas luvas de procedimento**



- Use luvas não estéreis para isolamento e precaução;
- Selecione as luvas de acordo com o tamanho da mão;
- Ao calçar a luva estenda-a até cobrir o punho do avental de precauções.

Sequência de **retirada** dos EPIs

22

(2) Sequência de retirada dos EPI

Remova o EPI à porta antes de deixar a sala ou quarto do paciente, ou na anti-sala

1. Luvas

A primeira luva deverá ser retirada e descartada no quarto e a segunda luva na antessala.



- Segure o lado de fora da luva com a mão oposta enluvada e remova-a.
- Segure a luva removida com a mão não enluvada.
- Introduza os dedos da mão não enluvada no punho da luva e remova-a de dentro para fora.

2. Capote ou Avental


- Higienizar as mãos após retirar o capote ou avental



- Solte o laço do pescoço e depois o da cintura.
- Remova o avental de dentro para fora, sem tocar o exterior.
- Após removê-lo, descarte-o na lixeira ou Hamper no caso de ser reprocessado.

3. Gorro (se utilizado)

4. Protetor ocular ou (b) Protetor facial



- O lado externo dos óculos é contaminado.
- Para removê-los, segure-o pelas pernas.
- Coloque no recipiente para reprocessamento.

5. (a) Máscara cirúrgica ou (b) Máscara PFF-2, N-95 ou similar

- Evitar tocar a área externa da máscara - descartar

- Higienizar as mãos após desprezar a máscara



- Puxe apenas as alças inferiores e após as superiores e remova.
- Descarte na lixeira.



♥ Obrigada! ♥



E-mail para contato: mitsue_s@hotmail.com